

लम्पी स्किन रोगबारे जानकारी

परिचय

- यो रोग गाईभैसीमा देखिन्छ।
- यो रोग मानिसहरुलाई सार्दैन।
- गर्मी मौसममा टोक्ने झिंगा (डाँस), लामखुट्टे, किर्ना जस्ता किराहरुको संख्या बढी हुने तथा थप सक्रिय हुने हुनाले यस रोगको प्रकोप बढी देखिन्छ।
- दूध उत्पादनमा तीव्र गिरावट आउँदछ।
- प्रजनन समस्या आउने तथा गर्भपतन हुन सक्दछ।
- भैसीको छालाको गुणस्तरमा ह्रास आउँदछ।
- वजन घट्ने र कहिलेकाहीं मृत्यु समेत हुन सक्दछ।
- गाईभैसीहरुको ओसारपसार तथा व्यापारमा प्रतिबन्ध गर्नु पर्ने हुँदा थप आर्थिक नोक्सानी हुने गर्दछ।

लक्षणहरु

- संक्रमित गाईभैसीले निम्न अनुसारका लक्षणहरु देखाउँदछन्:
- उच्च ज्वरो (१०४ डिग्री फरेनहाइट भन्दा माथि), दाना पानी कम खाने र दूध उत्पादन घट्दछ।
 - छालामा १-५ सेन्टिमिटरको साह्रो गोलो गिर्खाहरु (सामान्यतया सुरुमा टाउको र घाँटीमा) देखिन्छ। लामो रौं भएको गाईभैसीमा गिर्खाहरु सजिलै देखिदैनन्। जिउ छाम्दा तथा पानीले भिजेको अवस्थामा मात्र पत्ता लगाउन सकिन्छ।
 - सामान्य संक्रमणमा गिर्खाहरुको संख्या थोरै र गम्भीर संक्रमणहरुमा पूरै शरीर ढाक्ने गरी हुन सक्दछ।
 - गिर्खाहरु केही समय पछि हराउन सक्छन् तर कहिलेकाहीं गिर्खाहरु फुटेर गहिरो घाउ भई किरा तथा झिंगाहरुले (औसा) घाउलाई थप जटिल बनाउन सक्दछन्।
 - थुतुनो, ओठ, मुख र नाकभित्र घाउ देखिन्छन्।
 - आँखा र नाकबाट अत्यधिक मात्रामा तरल पदार्थ आउछ।
 - न्याल काढ्छ।
 - लिम्फ नोडहरु सुन्निने हुन्छ।
 - केही संक्रमित गाईभैसीहरुले कुनै पनि लक्षण नदेखाउन सक्छन्।



शरीरभरि गिर्खा देखिएको गाई

रोग सार्ने तरिका

- संक्रमित लामखुट्टे, टोक्ने झिंगा र किर्ना जस्ता किराहरुको टोकाइबाट,
- संक्रमित गाईवस्तुहरुको ओसारपसारबाट,
- सामुदायिक चरन क्षेत्र तथा दाना तथा पानी खाने ठाउँहरुबाट,
- प्राकृतिक वा कृत्रिम गर्भधानबाट,
- पशु उपचार गर्ने क्रममा फरक गाईभैसीहरुमा एउटै सुइको प्रयोगबाट,
- कहिलेकाहीं प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट



भैसीको शरीरभरि साना साना गिर्खाहरु देखिएको



पछाडिको भाग र थुन वरिपरि गिर्खा देखिएको

उपचार

यो रोगको प्रभावकारी उपचार छैन। रोग लाग्न नदिनु नै उत्तम उपाय हो।

रोगको शंका लागेमा के गर्ने ?

- रोगको प्रकोपको समयमा वा जोखिममा रहेका क्षेत्रमा पर्ने गाईभैसीहरुको दैनिक निरीक्षण गर्नु पर्छ।
- पशुहरुलाई रोग लागेको शंका भएमा तुरुन्त प्राविधिक, स्थानीय तहको पशु सेवा शाखा, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, पशु सेवा विभाग र अन्तर्गतका निकायलाई जानकारी दिनुहोस।
- लम्पी स्किन रोग भएको अवस्थामा रोग देखिएको क्षेत्रबाट पशुहरुको ओसारपसार तुरुन्त रोक्नु पर्छ।

फार्मको सुरक्षा कसरी गर्ने ?

- खोप लगाएर- प्रभावकारी खोप लगाएको तीन हप्ता भित्रमा रोग विरुद्ध पूर्ण सुरक्षा प्राप्त हुन्छ।
 - संक्रमित हुनु अघि नै गाईभैसीलाई खोप लगाउनु पर्छ।
 - खोपले कहिलेकाहीं केही गाईभैसीमा निम्न अनुसारका प्रतिक्रियाहरु देखाउन सक्छः
 - खोप लगाएको ठाउँमा हलुका सुन्निन्छ जुन १-२ हप्ता भित्रमा आफै हराएर जान्छ।
 - छोटो समयको लागि ज्वरो आउनुका साथै केही दिन दूध उत्पादन घट्न सक्दछ।
 - शरीर वा थुनमा साना गिर्खाहरु देखिन सक्छ जुन छिट्टै हराउँदछन्।
- विश्वसनीय स्रोतहरुबाट गाईभैसी खरिद गर्नुपर्दछ। गाईभैसी खरिद गरी ल्याएमा २८ दिनसम्म बथानबाट अलग्गै राख्नपर्दछ। रोगको प्रकोपको समय रोग लागेको ठाउँबाट गाईभैसी ल्याउनु हुँदैन।
- गोठलाई झिंगा, लामखुट्टे तथा अन्य किराहरुबाट मुक्त राख्न सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्दछ र आवश्यकता अनुसार उपयुक्त कीट विकर्षकको प्रयोग गर्नुपर्दछ।
- गोठ वरिपरि पानी जम्न दिन हुँदैन।
- फार्ममा जैविक सुरक्षाका उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्दछ।



गिर्खा फुटेपछिको घाउँ

थप जानकारीका लागि
पशु सेवा विभाग, हरिहरभवन
फोन नं: ०१-५५२१६१०, ०१-५५२५४७८, ०१-५५२२०५६
वेब: www.dls.gov.np



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations

